

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Селенцин®

наименование лекарственного препарата

Регистрационный номер.

Торговое название препарата

Селенцин®

Лекарственная форма

Таблетки подъязычные гомеопатические

Состав

(на одну таблетку)

Активные компоненты:

Lycopodium clavatum (Lycopodium) (ликоподиум клаватум (ликоподиум)) С6, Phosphorus (фосфорус) С6, Thallium aceticum oxydulatum (Thallium aceticum) (таллиум ацетикум оксидулатум (таллиум ацетикум)) С6, Acidum silicicum (Silicea) (ацидум силицикум (силицея)) С6, Aluminium oxydatum (Alumina) (алюминиум оксидатум (алюмина)) С6, Selenium (селениум) С6, Natrium chloratum (натриум хлоратум) С30, Kalium phosphoricum (калиум фосфорикум) С6.

Вспомогательные компоненты:

лактоза моногидрат 0,282 г, крахмал картофельный 0,015 г, кальция стеарат 0,003 г.

Описание

Таблетки белого, белого с сероватым или белого с желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрической формы, с риской.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство.

Фармакологические свойства

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

В комплексной терапии диффузного выпадения волос.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Возраст до 18 лет. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период лактации

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы

По 1 таблетке 3 раза в день под язык до полного растворения за полчаса до еды или через 1 час после еды. Продолжительность курса 2 месяца с недельным перерывом. При необходимости курс повторить с интервалом в 1 месяц.

